

RADIOAKTIVE ISOTOPE IN KLINIK UND FORSCHUNG

13. Band

1. Teil

**Gasteiner
Internationales Symposium
1978**

**Herausgegeben
von Rudolf Höfer
unter Mitarbeit von
Helmar Bergmann**



**Verlag
H. Egermann**

Z 79. 138 (13, 1)

ISBN 3-900287-01-5

**Bayerische
Staatsbibliothek
München**

Radioaktive Isotope in Klinik und Forschung
veranstaltet von der Nuclearmedizinischen Abteilung
der II. Medizinischen Universitätsklinik,
Leiter: Prof. Dr. R. Höfer, A-1090 Wien, Garnisongasse 13

©

Copyright by: Verlag H. Egermann — 1978
Hernalser Hauptstraße 196, A-1170 Vienna, Austria

Printed by: Egermann Druckereigesellschaft m. b. H. & Co. KG.,
A-1170 Vienna

79148/10

Inhalt

R. Bader, W. J. Lorenz: Messung der Verteilung kleinster inkorporierter Radioaktivitätsmengen	1
Auszug / Abstract / Extrait	12
B. Knoop, K. Jordan, O. Schober: Refokussierung eindimensionaler Ganzkörperprofile	15
Auszug / Abstract / Extrait	20
H. Bergmann: Ganzkörperprofilscanner zur quantitativen Aktivitätsmessung in vivo — Konstruktion, physikalische Kenndaten, Anwendungen . . .	23
Auszug / Abstract / Extrait	54
I. Fogelman, R. G. Bessent, J. G. Turner, D. L. Citrin, I. T. Boyle, W. R. Greig: The Role of Bone Scanning and Quantification of Skeletale Uptak of Radiopharmaceutical in Metabolic Bone Disease	57
Abstract / Extrait / Auszug	65
P. Heidenreich, L. Schmid, M. Oberdorfer, K. Kempken, G. Hör, H. Diermeier, H. W. Pabst: Doppelradionuklid-Clearancetechnik am teilabgeschirmten Ganzkörperzähler zur Bestimmung der renalen Filtrationsfraktion — Methodische Voraussetzungen und klinische Ergebnisse . .	67
Auszug / Abstract / Extrait	73
V. R. McCready, W. W. Seelentag, S. C. Lillicrap: A Double Isotope Technique for the Detection of Diffuse Liver Disease	75
Abstract / Extrait / Auszug	79
W. Heptner, M.-J. Badian, C. Obst, W. Rupp, K. D. Weimer: Vorteile radioimmunologischer Verfahren zur Bestimmung von Arzneimitteln im biologischen Material	81
Auszug / Abstract / Extrait	89
D. Ducassou, J. P. Nouel, A. Brendel: La marquage des elements figures du sang par l'indium radioactif — Methodologie — Resultats — Indications	91
Extrait / Abstract / Auszug	95
H. Deckart, J. Weiland, A. Blottner, M. L. Weiss: ^{99m}Tc -Thioglukose — Ein neues Radiopharmakon für die Nierendiagnostik	97
Auszug / Abstract / Extrait	104
G. Galy, R. C. Munsch, R. Pasqualini, Ch. A. Bizollon, M. Berger: Un Nouveau Marqueur Hepato-Splenique: Le Colloide de Phosphate Tricalcique — Sn — ^{99m}Tc Premiers Resultats	107
Extrait / Abstract / Auszug	110

M. Placchi, C. Delcroix, H. Bauduin: Investigation on the Metabolism of L Leucine in the Rat Exocrine Pancreas	113
Abstract / Extrait / Auszug	119
H. Renault, G. Noet, J. R. Rapin: Etude chez l'Animal de la Fixation de l'Ethambutol Marque au ^{14}C ou au ^{64}Cu sur le Tissu Sain ou Tumoral	121
Extrait / Abstract / Auszug	127
F. Lunghi, P. Riva, F. Assone, M. Villa, G. Plassio: Iodinated Bleomycin: A Radiopharmaceutical for Tumor Localication	129
Abstract / Extrait / Auszug	135
K. Kostic, R. Draskovic, I. Nagulic, D. Kostic, R. Draskovic: Trace Elements Distribution in Meningiomas and other Human Brain Tumours	137
Abstract / Extrait / Auszug	143
K.-F. Poulheim, V. Löbner, R. Scheler: Inkorporationsüberwachung von Anwendern offener radioaktiver Substanzen in Klinik und Forschung in der DDR	145
Auszug / Abstract / Extrait	153
B. Glöbel, E. Oberhausen, H. Muth: Strahlenschutzprobleme beim Umgang mit radioaktivem Jod in der Medizin	155
Auszug / Abstract / Extrait	164
K. Kletter, H. Frischauf, R. Nowotny, R. Dudczak: In vivo TLD-Messung der Strahlenbelastung nach Gabe von Tc 99m markierten Verbindungen	167
Auszug / Abstract / Extrait	175
B. Choné, G. Engelken, P. Schenck: Haematologische Verlaufsstudien an Schilddrüsenkarzinompatienten nach J-131-Therapie	177
Auszug / Abstract / Extrait	185
I. Schmitz-Feuerhake, K. Bätjer, R. Kollert, E. Muschol: Abschätzungen zum somatischen Strahlenrisiko im Bereich diagnostischer Dosis	187
Auszug / Abstract / Extrait	198
U. B. Noelpp, W. Schilt, M. Ramos: Ein einfaches und billiges System für die kontrollierte und herzphasengesteuerte Bolus-Injektion	201
Auszug / Abstract / Extrait	208
Dan G. Pavel, Ernest Byrom, Bronte Ayres, Raymond J. Pietras, Jesus A. Bianco, Charles Kanakis, Jr.: Multifaceted Evaluation of Left Ventricular Function by the First Transit Technique Using Anger Type Cameras and an Optimized Protocol. Correlation with Biplane Roentgen Angiography	209
Abstract / Extrait / Auszug	217

Harry Bishop, Thomas Nelson, Ismael Mena, Vladimir Bosnjakovic: Effect of Early Recirculant Flow on the Shape of the First Transit Activity-Time Curve: Model Demonstration	221
Abstract / Extrait / Auszug	225
E. Ogris, O. Pachinger, P. Probst, H. Sochor, G. Joskowicz, F. Kaindl: Evaluation of Global and Regional Left Ventricular Function by Radioisotope Techniques	227
Abstract / Extrait / Auszug	233
E. Sauer, J. Dressler, L. Lutitsky, H. Sebening, G. Hör, H. W. Pabst, H. Blömer: Linksventrikuläre Funktionsbeurteilung durch EKG-getriggerte Herzbinnenraumszintigraphie während Ergometerbelastung	235
Auszug / Abstract / Extrait	239
A. Höck, A. Höck, K. Vyska, Chr. Freundlieb, L. E. Feinendegen: Eine radiokardiographische Methode zur kontinuierlichen Erfassung von kardialen und pulmonalen Blutvolumenänderungen während der Belastung bei Normalpersonen, Athleten und Patienten mit latenter Herzinsuffizienz	241
Auszug / Abstract / Extrait	247
W. H. Knapp, H. Tillmanns, J. Doll, K. Mäurer: Radiokardiographie und Echokardiographie bei der koronaren Herzkrankheit — Nicht-invasive Verfahren zur Bewertung der globalen Myokardfunktion	249
Auszug / Abstract / Extrait	255
J. H. McKillop, R. G. Murray, J. G. Turner, H. W. Gray, R. G. Bessent, A. R. Lorimer, W. R. Greig: Thallium-201 Myocardial Imaging in the Detection of Coronary Artery Disease: Sensitivity and Specificity	257
Abstract / Extrait / Auszug	263
Chr. Freundlieb, A. Höck, K. Vyska, L. E. Feinendegen, H. J. Machulla, G. Stoecklin: Anwendung von J-123-markierten langkettigen Fettsäuren zum Studium des Herzmuskelstoffwechsels	265
Auszug / Abstract / Extrait	271
W. Burguet, R. Radermecker: Interet et Pieges du Dosage Radioimmunologique des Corps Digitaliques	273
Extrait / Abstract / Auszug	285
J. A. Patton, A. B. Brill: X-Ray Fluorescence Techniques for Thyroid Imaging Methods and Results	287
Abstract / Extrait / Auszug	297
Thomas C. Hill: Early Clinical Experience with a Radioisotope Computerized Emission Tomographic Brain Imager System	299
Abstract / Extrait / Auszug	305
K. J. Vikterlöf, J. Bertling: A Versatile Patient Table for Gammacamera	307
Abstract / Extrait / Auszug	309

W. Schlegel, R. Vaknine, W. J. Lorenz, P. Georgi, U. Schulz: Ein neues quantitatives Verfahren zur Befundung von Leberszintigrammen . . .	311
Auszug / Abstract / Extrait	318
D. Lange, H. J. Hermann, E. Wetzel: Regional Distribution of Correction Factors at High Photon Fluence Rates — A Definition for a "Fast" Scintillation Camera	321
Abstract / Extrait / Auszug	331
G. Roux: La collimation pour la scintigraphie du corps entier applique au dispositif scintigraphique « scanicamera »	333
Extrait / Abstract / Auszug	339
H. Bockslaff, E. Jahns, H. Hundeshagen: Kamera-Szintigraphie mit einem Doppel-Lochblendenkollimator zur nicht-invasiven Diagnose intraokularer Tumoren	341
Auszug / Abstract / Extrait	348
B. Philippon, F. Artru, G. Favre et al.: Debits Sanguins Cerebraux Regionaux-Mesurés par Inhalation de Xenon 133 avec une Gamma-Camera: Utilisation de la Soustraction de Spectre, et Premiers Résultats dans les Accidents Vasculaires Cerebraux et les Comas Traumatiques	349
Extrait / Abstract / Auszug	355
U. Lyng-Tunell, A. Bergvik, B. Söderborg: Quantitative Cisternography . . .	357
Auszug / Abstract / Extrait	362
B. Silfverskiöld, A. Bergvik: Cisternography Using Computerized TV-Pictures	365
Abstract / Extrait / Auszug	372
B. Söderborg, A. Asaba, B. Gunnarsson, K. Jekell, A. Kiibus, S. Sandquist: Continuous Radioisotope Infusion. A New Method of Haemodynamic Studies	373
Abstract / Extrait / Auszug	378
D. K. Falch, A. E. Odegaard, N. Norman: Decreased Renal Plasma Flow During Propranolol Treatment. Renography and Radiocardiography in the Control of Antihypertensive Treatment	381
Abstract / Extrait / Auszug	384
H. Schicha, J. Grüntzig, V. Becker, J. Kiem, L. E. Feinendegen: Experimentelle Studien zur Lymphdrainage des Auges unter Anwendung radioaktiver Kolloide	387
Auszug / Abstract / Extrait	395
K. Joseph, J. Mahlstedt, H. H. Pries, U. Schmidt, U. Welcke: Früherkennung und Prognose der thyreoidalen Autonomie im Endemiegebiet . . .	397
Auszug / Abstract / Extrait	407

D. G. McLarty, W. D. Alexander, P. W. Horton, D. H. Clark: The Effect of Thyroidectomy on the Course of Thyrotoxicosis: Value of Radioisotopic Studies	409
Abstract / Extrait / Auszug	415
G. Katona, A. Zimbron: The Usefulness of Radioisotopes in Rheumatology — Diagnostic and Research Experiences	417
Abstract / Extrait / Auszug	432
P. Pfannenstiel, U. Semmler, W. Adam, A. Halbsguth: Quantitative Gelenkszintigraphie	433
Auszug / Abstract / Extrait	444
S. Spies, D. Green, N. A. Rana, J. W. Milgram, R. Mintzer: Equilibrium Blood Pool Scanning in the Evaluation of Hemophilic Arthropathy	447
Abstract / Extrait / Auszug	451
S. T. Ostrowski, J. M. Wilkinson, J. P. Browlett: Radioisotope Scanning after Total Hip Replacement	453
Abstract / Extrait / Auszug	459
P. Kostamis, P. Ziroyanis, D. Maintas, L. Vita, C. Constantinides, N. Papadoyanakis, S. Mouloupoulos: Scintigraphic Skeletal Changes in Chronic Haemodialysis Patients	461
Abstract / Extrait / Auszug	467
R. Bianchi, C. Vitali, A. Clerico, A. Pilo, L. Fusani, G. Mariani: Uric Acid Turnover in Man by Chromatographic Measurement of the Specific Activity of ^{14}C -Uric Acid in Plasma and Urine	469
Abstract / Extrait / Auszug	476
W. G. Wood, I. Marschner, P. C. Scriba: Rapid and Sensitive Radioimmunoassay for Human Parathyrin	479
Abstract / Extrait / Auszug	487
A. Bertrand, J. F. Chatal, X. de Tovar, P. Henry, F. Therain: Intérêt du Citrate de Gallium 67 dans le Diagnostic et la Localisation des Abces Profonds de l'Abdomen	489
Extrait / Abstract / Auszug	495

RAPID AND SENSITIVE RADIOIMMUNOASSAYS FOR HUMAN PARATHYRIN

W.G. Wood, I. Marschner and P.C. Scriba

INTRODUCTION

The main disadvantage in the radioimmunoassay (RIA) of human parathyrin (hPTH) is the long incubation time supposedly required to achieve the sensitivity needed in measuring hPTH in normals (1), (2), (4), (9). To minimise the time between receipt of the blood and the arrival of results on the doctor's desk, studies were undertaken to minimise the assay time without reducing the sensitivity in the assay of carboxy-regional peptides of hPTH (C-hPTH). By optimising the assay, the incubation time was reduced from 7 days in the original assay (9) to 6 or 24 hours without influencing the clinical value of the results.

MATERIALS AND METHODS

a) Antibodies. The antibodies used were obtained from Drs. HESCH and HEHRMANN in Hannover (FRG) and were raised in sheep immunised with a mixture of bovine and porcine parathyrin (bPTH, pPTH). The code numbers allotted to the antibodies (Ab) were S-469 VI and S-478 VI. Ab S-469 VI was used at an initial dilution (i.d.) 1:20 000 and S-478 VI at an i.d. of 1:2400.

b) Standards. bPTH was obtained from Inolex Chicago, Lot No. 1508 B 002 for standards and Lot No. 1515 A 001 for labelling. "C-hPTH-standards" were obtained from a patient with secondary hyperparathyroidism (2. HPT) and were calibrated against the S-469 VI Ab.

All standards were made up in parathyrin free serum (PTHFS) obtained from parathyroidectomised patients.

Tracer was prepared by a modified form of the Chloramine-T-method of GREENWOOD et al. (7). 10 µg bPTH (1 µg/µl in 0.1 M HCl) was reacted with 10 µl Chloramine-T (8.9 mM), 20 µl Na¹²⁵I (37.2 MBq) and 100 µl phosphate buffer (0.5 M, pH 7.65) for 30 sec. when the reaction was stopped with 100 µl Na₂S₂O₅ (6.6 mM). The mixture was then transferred to a 9 × 1 cm Sephadex G-10 column and eluted off using 0.05 M barbital buffer, pH 7.8, containing 1% human serum albumin (HSA) and 12.5 antiplasmin units (APU) of Aprotinin/ml (Trasylol[®]-Bayer), (Buffer 2).

The protein peak containing ¹²⁵I-bPTH was then transferred to a 130 x 2.5 cm Ultrogel AcA-54 column and eluted off at 4°C with 0.5 M ammonium acetate buffer (pH 4.5) containing 0.01% merthiolate (Buffer 3). The fractions containing the radioactive peaks were tested for immunoreactivity and those with the highest maximum binding (B₀) and lowest unspecific binding (N) diluted to an end radioactivity of 10 KBq/ml. The tracer was useable for more than 3 months without appreciable change in the binding characteristics to the antibody. Both Ab and tracer were diluted with Buffer 2.

c) Assays.

(I) Original Assay - S-469 50CL. This was the original assay used by HEHRMANN et al. (9) in which 50 μ l serum and 200 μ l S-469 VI (i.d. 1:20 000) were preincubated for 4 days at 4° C. 100 μ l tracer (50 Bq) were added and a further 3 day incubation carried out at 4° C. 1000 μ l dextran-charcoal (2.5 g Dextran T-70 (Pharmacia) + 25 g Norit A in 1000 ml Buffer 2) was added to the tubes which were then centrifuged for 15 minutes, after which the supernatant (1000 μ l) was transferred to a clean tube, stoppered and counted for 5 minutes. Range of the standard curve was 0.19 - 12.5 ng bPTH/ml.

(II) Modified Long assay - S-469 50L. This assay was identical with (I) above except that 170 Bq tracer was used, and separation of bound and free hormone was with 1000 μ l 12% polyethylene glycol (PEG) in 0.18 M NaCl. After centrifugation and aspiration of the supernatant, the precipitate was counted for 2 minutes. In both (I) and (II) B₀ was set up in 10 tubes and each standard/serum in 5 tubes.

(III) Short Assay - S-478 90Q. The difference here was the use of Ab S-478 VI (i.d. 1:2400), 90 μ l standard/serum instead of 50 μ l, preincubation of 18 hr, and incubation with tracer (330 Bq) 6 hr. Separation of bound and free hormone was by 12% PEG. Here B₀ was set up in 6 tubes and each standard or serum in 3 tubes.

(IV) Superquick Assay - S-478 90SQ. Here a standard curve was set up using C-hPTH standards (0.15 - 10 ng eq/ml) and the assay consisted of a single 6 hr incubation with serum (90 μ l) Ab (200 μ l S-478 VI i.d. 1:2400) and tracer (100 μ l = 500 Bq) and PEG separation. Tubes were counted for 60 - 90 sec.

d) Kinetic Studies.

Kinetic studies were carried out using Ab S-478 VI. Human sera with 1 and 3 ng eq/ml and bPTH standards of 1 and 3 ng/ml together with PTHFS as a zero standard were compared over a 7 - 10 day incubation period - with and without 18 hr-preincubation.

e) Establishment of normal range.

Normal ranges were established for the S-469 50L and S-478 90Q assays together with correlations between the two with a comparison of a normal collective, patients with calcium metabolism disturbances not due to parathyroid changes and patients with primary and secondary hyperparathyroidism (1. and 2.HPT).

RESULTS

a) Tracer

Fig. 1a shows the elution profile of the tracer on Sephadex G-10 and Fig. 1 b of the ¹²⁵I-bPTH peak from the Sephadex G-10 on Ultrogel AcA-54. In Fig. 1 b the radioactive peaks are seen together with B₀ and N in the main peaks. The second main peak is probably the alpha-chain of haemoglobin and it shows no reaction with either the C-regional antibodies S-469 VI, S-478 VI or the European Parathyroid Study

Group (EPGS) anti-1-34 hPTH. With this preparation no "damage" was to be seen. The tracer could be used for longer than 3 months.




Fig. 1 (a) left : Elution profile of ^{125}I -bPTH mixture from iodination on Sephadex G-10. Fractions contain 0.55 ml - column 9x1 cm.
(b) right: Elution profile of ^{125}I -PTH peak on Ultrogel ACA-54. I, II and III show maximum binding (B_0) of immunoreactive bPTH in the main peaks after 6 hr incubation at 4°C with Ab S-469 VI i.d. 1:1000. Fractions contained 4.55 ml.

b) Assays

In the S-478 90Q assay (as well as the S-469 50Q assay) the "hook-effect" (11) was abolished with the increase in tracer. Fig. 2 shows the normal range of S-469 50L and S-478 90Q in 47 volunteers and the results of 90 patients without HPT and with 1. and 2. HPT.




Fig. 2: Normal ranges (upper limits shown by dotted lines) in 47 normocalcaemic volunteers and 90 patients with calcium metabolism disturbances not due to HPT (Non-HPT) and primary and secondary HPT (1° HPT, 2° HPT).

Correlation between 109 patients measured in both assays gave the following values - correlation coefficient $r = 0.872$ and for the regression equation $y = a + bx$, $a = 0.323$, $b = 1.217$.

Table 1 shows the main characteristics of the S-469 50L and S-478 90Q assays. Table 2 shows results of a catheter study of the neck veins in a patient with suspected 2. HPT using S-469 50L, S-478 90Q and S-478 90SQ assays.

The superquick assay S-478 90SQ was only intended for emergency and was not introduced into routine use, although one can see that the clinical value for localisation of an adenoma is as good as the other assays when compared with the values of the control sera.

Table 1: Main characteristics of S-469 50L and S-478 90Q assays.

	S-469 50L	S-478 90Q
1) Ab initial dilution	1:20 000	1:2400
2) Incubation times		
(a) preincubation	96	18
(b) after tracer addition	72	6
3) $100 \cdot (B_0 - N)/T$	30	10
4) Normal range ng eq/ml	up to 0.5	up to 1.0
5) Sensitivity ng bPTH/ml	0.28 ± 0.13 (n=10)	0.28 ± 0.08 (n=12)
6) 50% intercept ng bPTH/ml	2.4 ± 0.4 (n=10)	2.5 ± 0.2 (n=12)
7) Tracer/tube Bq	170	330

Table 2: Results of a catheter study of the veins in the thyroid region of a patient with suspected 2^o HPT.

	Assay - ng eq/ml		
Control sera	S-469 50L	S-478 90Q	S-478 90SQ
1	0.41	0.21	0.17
2	0.79	0.55	0.53
3	3.04	3.35	4.80
Catheter location			
r.int.jug.v.upp.	0.90	1.27	1.28
low.	0.95	1.38	1.21
l.int.jug.v.upp.	0.75	1.42	1.46
low.	1.05	1.26	1.39
thyroid ima v.	4.89	5.98	5.24
int.thyroid v.	4.05	5.96	4.32
l.subclavian v.	1.16	1.42	1.61

c) Kinetics

Fig. 3a shows the binding kinetics (Ab S-478 VI) over 7 days of human and bovine PTH with the ^{125}I -bPTH tracer, with 18 hr preincubation before tracer addition. Fig. 3 b shows the same data but without the preincubation prior to tracer addition. Here the difference in the binding of hPTH and bPTH is plain to see by the difference in the amount of tracer bound - especially in the initial phases, and shows why the S-478 90 SQ assay only works with a C-hPTH standard curve.




Fig. 3 a : Kinetics of Ab S-478 VI i.d. 1:2400 over a 168 hr period at 4°C . Tracer given after 18 hr preincubation of serum and antibody. Binding expressed as cpm bound (Total counts = 22000 cpm).




Fig. 3 b : As for Fig. 3 a, but without 18 hr preincubation step.

The circulating forms of hPTH are so varied (3), (5), (6), (8), (12) that different assays are needed to locate all the peptides present in the blood. The antibody used here (S-478 VI) recognises both C-regional peptides as well as the intact 1-84 hPTH molecule. This has been demonstrated in this laboratory and elsewhere (9), (10) by the fact that S-478 VI shows similar sloped dose response curves with the MRC 75/549 1-84 hPTH reference preparation as well as the tissue culture preparations P2 (1-84 hPTH) and P4 (C-regional hPTH) (of MONTZ in Hamburg). The fact that P2 and P4 show identical dilution curves (WOOD, 1977, unpublished data) demonstrates that Ab S-478 VI does not differentiate between 1-84 hPTH and C-regional fragments. Ab S-478 VI does not react with N-regional peptides (9).

Attempts to use anything except PTH-free serum in which to dissolve the standards were abandoned as the dose response curves did not run parallel to the PTHFS curves. Systems tried included serum from parathyroidectomised dogs, horses, "stripped-serum" and a synthetic serum-like solution of albumin and globulins in Ringer solution. Similarly, attempts to use Ab S-469 VI in a short assay were quickly abandoned as the results were approximately 3-times higher than those from the S-469 50L assay, although the correlation coefficient was good ($r = 0.963$, $n=81$).

The use of PEG has its drawbacks in as much as it is serum globulin dependant. This means that all cases of disprotein-aemia and dialysis patient sera as well as those with total protein outside the range 6-8 g/dl must be run with an unspecific binding. This accounts for about 10% of all patients in this laboratory.

The results show that despite the drastic shortening of the assay times, together with new labelling and separation techniques, the shorter assays give results which are just as sensitive and reproducible. The difference in reaction rates between bPTH and hPTH and Ab S-478 VI when no pre-incubation has been made, has been used in developing a same day-assay (S-478 90SQ) in which the clinician can receive the results of emergency cases of suspected HPT on the same day. By combining this with a catheter study of the neck-veins, the surgeon can know the most likely situation of an adenoma or hyperplastic parathyroid gland.

REFERENCES

- (1) ALMQUIST, S., B.HJERN and B.WÄSTHED (1975): The diagnostic value of a radioimmunoassay for parathyroid hormone in human serum. *Acta Endocrinol.* 78, 493-509.
- (2) ARNAUD, C.D., H.S.TSAO and T.LITLEDIKE (1971): Radioimmunoassay of human parathyroid hormone in serum. *J.Clin.Invest.* 50, 21-34.

- (3) ARNAUD, C.D., R.S.GOLDSMITH, G.W.SIZEMORE, S.B.OLDHAM, J.BISCHOTT, J.A.LARSEN, and P.BORDIER (1972): Studies on characterisation of human parathyroid hormone in hyperparathyroid serum: practical considerations. In: Excerpta Medica International Congress Series, No. 270, Amsterdam, p.281.
- (4) BERSON, S.A., and R.S.YALOW (1963): Immunoassay of bovine and human parathyroid hormone. Proc.Nat.Acad.Sci. 49, 613-617.
- (5) BERSON, S.A., and R.S.YALOW (1968): Immunochemical heterogeneity of parathyroid hormone in plasma. J.Clin.Endocrinol.Metab. 28, 1037-1047.
- (6) CANTERBURY, J.M., and E.REISS (1972): Multiple immuno-reactive molecular forms of parathyroid hormone in human serum. Proc.Soc.Exp.Biol.Med. 140, 1393-1398.
- (7) GREENWOOD, F.C., W.M.HUNTER, and J.S.GLOVER (1963): The preparation of ^{131}I -labelled growth hormone of high specific activity. Biochem.J. 89, 114.
- (8) HABENER, J.F., D.POWELL, T.M.MURRAY, G.P.MAYER and J.T.POTTS jr. (1971): Parathyroid hormone: secretion and metabolism in vivo. Proc.Nat.Acad.Sci. USA 68, 2986-2991.
- (9) HEHRMANN, R., R.WILKE, J.P.NORDMEYER, and R.D.HESCH (1976): Hochsensitiver C-terminalspezifischer Radioimmunoassay für menschliches Parathormon als Routinemethode. Dtsch.Med.Wschr. 101, 1726-1729.
- (10) HEHRMANN, R., J.P.NORDMEYER, R.WILKE, and R.D.HESCH (1977): Radioimmunoassay of human PTH: Characterisation of two new antisera from sheep and clinical results. Acta Endocrinol.Suppl. 208, 117.
- (11) JOEL, E.W., D.K.SCHÖNBERG, W.ILG, and E.KELLER (1974): Problems of optimization of double antibody radio-immunoassay of hLH, hFSH and hGH: "hook" phenomenon, false negative patient values and linearity of values from patient plasma dilutions. In: Radioimmunoassay and related procedures in medicine, Vol. 1, International Atomic Energy Agency, Vienna, p.45-56.
- (12) SILVERMAN, R., and R.S.YALOW (1973): Heterogeneity of parathyroid hormone: Clinical and physiological implications. J.Clin.Invest. 52, 1958-1971.

Adressen:

Dr.W.G.WOOD, Laboratorien für Klinische Chemie und Endokrinologie, Medizinische Klinik Innenstadt der Universität, Ziemssenstraße 1, D-8000 München 2, BRD.

Dr. I. MARSCHNER, ebenda.

Prof. Dr. P.C. SCRIBA, ebenda.

Abstract

Radioimmunoassays for the carboxy-regional peptides of human parathyrin (hPTH) have been developed to give results within either 8 or 30 hr after receipt of blood, as compared with several days in the original method using the same antibodies (S-469VI, S-478VI). The achievement of such short assay times is due to a modification of the WIDE technique and the different binding between bovine and human parathyrin to the antibodies, raised in sheep against a mixture of porcine and bovine parathyrin. The results of these short assays have the same clinical value as the longer assays in differentiating between normals and patients suffering from hyperparathyrinaemia (HPT). The value of these assays is the rapid answer to clinicians and surgeons' questions as to whether a patient has HPT. By combination of the 8 hr-assay with a catheter study of the veins of the thyroid region, the surgeon can know on the same day not only whether the patient has HPT, but also the probable location of an adenoma if present, thus facilitating his task.

Extrait

On a développé des dosages radioimmunologiques pour les peptides carboxy régionaux du parathyrin humain (PTH), qui donnent des résultats soit 8 heures, soit 30 heures après la prise du sang. Vis-à-vis de la méthode originale qui applique les mêmes anticorps S-469VI/S-478VI, on obtient ainsi une économie de temps de 4 jours. De tels essais brefs sont devenus possibles par la modification de la technique de WIDE; en outre on a exploité la différence de liaison du parathyrin bovin et du parathyrin humain avec les anticorps, qui ont été gagnés dans des moutons par immunisation avec le parathyrin bovin et parathyrin porcine. Les résultats de ces essais brefs ont la même importance clinique que les essais longs pour différencier entre les patients à parathyrin normale et patients à hyperparathyrinémie (HPT). L'avantage de ces essais est la réponse rapide à la question des cliniciens, si un HPT est présent. Le chirurgien peut apprendre la localisation possible d'un adénome le même jour par la combinaison de l'essai de 8 heures avec l'étude des PTH-taux aux veines du cou.

Auszug

Es wurden Radioimmunoassays für die Carboxy-regionalen Peptide des humanen Parathyrins entwickelt, die Ergebnisse entweder 8 Stunden oder 30 Stunden nach Blutabnahme liefern. Gegenüber der Originalmethode, die die gleichen Antikörper S-469VI/S-478VI verwendet, wurde so eine Zeitersparnis von über 4 Tagen erreicht. Solche Kurzassays wurden möglich durch die Modifizierung der Wide-Technik. Ausgenutzt wird weiterhin die unterschiedliche Bindung des bovinen und des humanen Parathyrins mit den Antikörpern, die in Schafen durch Immunisierung mit bovinem und porcinem Parathyrin gewonnen wurden. Die Ergebnisse dieser Kurzassays haben die gleiche klinische Bedeutung wie die des Langassays zur Differenzierung zwischen Patienten mit normalem Parathyrin und solchen mit Hyperparathyrinämie (HPT). Der Vorteil dieser Assays ist die schnelle Antwort auf die Frage der Kliniker, ob eine HPT vorliegt. Bei der Kombination des 8 Stunden-Assays mit einer Katheterstudie der Halsvenen kann der Chirurg noch am gleichen Tag die mögliche Lage eines Adenoms erfahren.

Sachverzeichnis

Abcès de l'abdomen, ^{67}Ga	489, 692 ⁺
Abwasserbelastung durch Radiojod	157, 648 ⁺
Angiography, radionuclide, in vascular disease	775
Angiography and first transit technique in left ventricular function	209, 655 ⁺
^{198}Au -Kolloid, Lymphdrainage des Auges	387, 683 ⁺
Arthropathy, hemophilic, blood pool scanning	447, 687 ⁺
Autonomes Schilddrüsengewebe, Volumenbestimmung	399
Autonomes Schilddrüsenadenom, Diagnostik	731
Autonomie, thyreoidale, Früherkennung	397
Bleomycine, iodinated, tumor localization	129, 644 ⁺
Blood flow, regional, brain, ^{133}Xe	499
Blood flow studies, continuous infusion	373, 682 ⁺
Blood pool scanning, hemophilic arthropathy	447, 687 ⁺
Blood supply and bone uptake	561
Blutvolumenänderungen, pulmonale und cardiale, kontinuierliche Messung	241, 660 ⁺
Bolusinjektion, herzphasengesteuert, einfaches System	201, 654 ⁺
Bone scanning, quantification	57, 635 ⁺
Bone uptake and blood supply	561
Bone uptake of rare earths	531
Brain imaging, radioisotope emission tomographie	299, 667 ⁺
Brain, regional blood flow, ^{133}Xe	499
Brain tissue, in vitro activation	137, 645 ⁺
Brain tumours, trace elements distribution	137, 645 ⁺
^{47}Ca Calcium, Knochenakkretion	38, 632 ⁺
Cardiale Volumenänderungen, kontinuierliche Messung	241, 660 ⁺
Chromatographic measurement of uric acid turnover	469, 691 ⁺
^{51}Cr EDTA Clearance	69, 636 ⁺
Cerebro-cerebellar degeneration, cisternography	365, 679 ⁺
^{14}C -éthambutol, fixation tumoral	121, 643 ⁺
^{14}C -Nomifensin	85, 638 ⁺
^{14}C -uric acid turnover	469, 691 ⁺
Cisternography	357, 677 ⁺
Cisternography, computerized TV-pictures	365, 679 ⁺
Clearancetechnik, Doppelradionuklide, teilabgeschirmter Ganzkörperzähler	67, 636 ⁺

* Discussion

Comas traumatiques, Xenon 133	349, 676 ⁺
Collimation, scintigraphie du corps entier, Scanicamera	333, 673 ⁺
Collimator design	783
Coronary artery disease, ²⁰¹ Tl myocardial imaging	257, 663 ⁺
⁶⁴ Cu-éthambutol, fixation tumoral	121, 643 ⁺
Dead time measurements, scintillation camera	321, 671 ⁺
Débits sanguins cerebraux regionaux, mesure	349, 676 ⁺
Dementia, computerized cisternography	367, 679 ⁺
Diagnostische Dosen, Strahlenrisiko	187, 652 ⁺
Diethyl-IDA, ^{99m} Tc, Leberfunktionsszintigraphie	707, 723 ⁺
Digitaliques, corps de, dosage radioimmunologique	273
Doppellochblendenkollimator, Diagnose von Augentumoren	341, 675 ⁺
Double isotope technique in diffuse liver disease	75, 637 ⁺
Echokardiographie und Radiokardiographie bei Herzkrankheiten	249, 661 ⁺
Emission tomography with radioisotopes	299, 667 ⁺
Ergometerbelastung, Herzinnenraumszintigraphie	235, 659 ⁺
Ethambutol marqué au ¹⁴ C ou au ⁶⁴ Cu, fixation tumoral	121, 643 ⁺
Fettsäuren, langkettige, ¹²³ I-markierte	265
Filtrationsfraktion, Bestimmung mit teilabgeschirmtem Ganzkörperzähler	67, 636 ⁺
First transit technique, left ventricular function	209, 655 ⁺
Fracture of bone, uptake and blood supply	565
FT-4-Wert, Nomogramm	611
⁶⁷ Ga citrate and ^{99m} Tc sulphur colloid, double isotope technique in diffuse liver disease	75, 637 ⁺
⁶⁷ Ga citrate diagnostic des abcès de l'abdomen	489, 692 ⁺
Gammacamera, patient table	307, 669 ⁺
Ganzkörperprofile, Refokussierung	15, 631 ⁺
Ganzkörperprofilscanner, quantitative in vivo Messungen	23, 632 ⁺
Ganzkörperretention, Inkorporationsdosimetrie bei Niereninsuffizienz	575
Ganzkörperzähler, teilabgeschirmter, Bestimmung der Filtrationsfraktion	67, 636 ⁺
Ganzkörperzähler, Inkorporationsmessungen	2, 629 ⁺

Ganzkörperzähler, variable Meßgeometrie	147, 646 ⁺
Gelenkszintigraphie, quantitative	433, 686 ⁺
Geometry, collimator-detector transfer function	783
Global left ventricular function	227, 657 ⁺
Gout, uric acid turnover	472, 691 ⁺
Graves'disease, thyroid stimulating antibodies	745
Haemodynamic studies, continuous isotope infusion	373, 682 ⁺
Halbleiterdetektor, im Ganzkörperzähler	3, 629 ⁺
Hämatologische Veränderungen nach ¹³¹ I-Therapie	177, 650 ⁺
Hematies, marquage par l'indium radioactif	91, 639 ⁺
Herzinnenraumszintigraphie bei Ergometerbelastung	235, 659 ⁺
Herzinnenraumszintigraphie EKG getriggerte	235, 659 ⁺
Herzinsuffizienz, cardiale und pulmonale Blutvolumen- änderungen	241, 660 ⁺
Herzmuskelstoffwechsel, ¹²³ I-Fettsäuren	265
Herzphasengesteuerte Bolusinjektion, einfaches System	201, 654 ⁺
Hip replacement, radioisotope scanning	453, 689 ⁺
Image distortion, high countrates, gammacamera	321, 671 ⁺
¹¹¹ In, marquage des elements figures du sang	91, 639 ⁺
- DPTA, computerized cisternography	366, 679 ⁺
- DPTA, quantitative cisternography	357, 677 ⁺
- oxine, labelling leucocytes	545
- oxine, labelling white blood cells	541
^{113m} Indium-Transferrin, Blutvolumenmessung	241, 660 ⁺
- transferrin, cardiac output measurement	381
- Transferrin, Plazentadurchblutung	583
-, use in rheumatology	417, 685 ⁺
Inhalation de ¹³³ Xenon, débits sanguins cerebraux	349, 676 ⁺
Inkorporationsdosimetrie, Ganzkörperretention, Nieren- insuffizienz	575
Inkorporationsmessungen	1, 629 ⁺
-, Automatisation	9, 629 ⁺
Inkorporationsüberwachung	145, 646 ⁺
In vivo Neutronenaktivierung, Ganzkörpermessung	7, 629 ⁺
Iodine content, thyroid fluorescence techniques	290, 665 ⁺

123J-Fettsäuren, Herzmuskelstoffwechsel	265
125J-Fibrinogentest	619
- Urinanalysen	156, 648 ⁺
131I-Bleomycine, tumor localization	129, 644 ⁺
- HSA, quantitative cisternography	357, 677 ⁺
- Orthoiodohippurane, ERPF-measurement	381
131J-Hippuran Clearance	67, 636 ⁺
- Hippuran, Ganzkörperretentionsstudien bei Niereninsuffizienz	576
- Inkorporationsmessung, Ganzkörperzähler	156, 648 ⁺
- Therapie, Schilddrüsenkarzinome, hämatologische Veränderungen	177, 650 ⁺
Jodochloroquine, Diagnose von Augentumoren	344, 675 ⁺
Kameradiagnostik intraokularer Tumoren	341, 675 ⁺
Kidneys, artificial, flow patterns	375, 682 ⁺
Knochenakkretion, ⁴⁷ Calcium, ^{99m} Tc-Pyrophosphat	38, 632 ⁺
Knochenszintigraphie nach Transplantation	761
Kollimatoren, Kamera, Monte-Carlo Berechnung	797
Kollimatorsystem für Ganzkörperprofilscanner	26, 632 ⁺
Leberdurchblutung bei Zirrhose	591
Leberfunktionsszintigraphie	707, 723 ⁺
Leberszintigrammbefundung, quantitatives Verfahren	311, 670 ⁺
Left ventricular function evaluation	209, 655 ⁺
Left ventricular function, global and regional evaluation	227, 657 ⁺
L leucine metabolism in the rat	113, 642 ⁺
Leucocytes, ¹¹¹ In oxine labelled, abscess scanning	544
Leukämie, myeloische, strahleninduzierte	193, 652 ⁺
Linksventrikuläre Herzfunktion bei Ergometerbelastung	235, 659 ⁺
Liver disease, double isotope technique	75, 637 ⁺
Luftkontamination durch Radiojod	161, 648 ⁺
Lungenkarzinom, strahleninduziertes	191, 652 ⁺
Lymphatische Drainage von Kolloiden aus Vorderkammer	389, 683 ⁺
Lymphdrainage des Auges, radioaktive Kolloide	387, 683 ⁺
Lymphocytes, ¹¹¹ In labelled	545

Mammakarzinom, strahleninduziertes	192, 652 ⁺
Mandibular motion, point source displacement	603
Meningeomas, trace elements distribution	137, 645 ⁺
Minimal meßbare Aktivitäten, Profils Scanner	37, 632 ⁺
Monte-Carlo Berechnung, Kollimatoren	797
Mössbauer effect, rare earths bone uptake	531
Myocardial imaging, ²⁰¹ Tl	257, 663 ⁺
Myokardfunktion, globale, Radiokardiographie und Echographie	249, 661 ⁺
Neutron activation in vitro, brain tissue	137, 645 ⁺
Neutronentherapie, induzierte Radioaktivität	6, 629 ⁺
Nierendiagnostik, ^{99m} Tc-Thioglukose	97, 640 ⁺
Niereninsuffizienz, Inkorporationsdosimetrie und Ganzkörperretention	575
Nonogramm für FT-4-Wert	611
Nomifensin-RIA	87, 638 ⁺
Pancreas, metabolism of L leucine	117, 642 ⁺
Pancreas scanning, variations of shape	695, 723 ⁺
Pankreas-Funktionsszintigraphie, Doppelradionuklidtechnik	703, 723 ⁺
Parathyrin radioimmunoassay	479, 692 ⁺
Penetration, collimator transfer function	787
²⁰³ Pb-Tris, Diagnose von Augentumoren	344, 675 ⁺
Perfusion, placentare	583
Pharmakologische Untersuchungen mit Radioimmunoassay	81, 638 ⁺
Plaquettes, marquage par l'indium radioactif	91, 639 ⁺
Plazentadurchblutung	583
Point source displacement, measurement of mandibular motion	603
Polynucléaires, marquage par l'indium radioactif	91, 639 ⁺
Profilmessungen im Ganzkörperzähler, quantitative	23, 632 ⁺
Pulmonale Volumenänderungen, kontinuierliche Messung	241, 660 ⁺
Quantitative analysis, hip scanning	455, 689 ⁺
Quantitative Gelenkszintigraphie	433, 686 ⁺
Quantitative Leberszintigrammbefundung	311, 670 ⁺
Radioaktivität, offene, Inkorporationsüberwachung	145, 646 ⁺
Radiocholegraphie, ^{99m} Tc-Hepatobida	719, 723 ⁺

Radioimmunoassay, corps digitaliques	273
Radioimmunoassay for Parathyrin	479, 692 ⁺
Radioimmunoassay zur Arzneimittelbestimmung	81, 638 ⁺
Radioisotope infusion, continuous, haemodynamic studies	373, 682 ⁺
Radioisotope emission tomography, brain imaging	299, 667 ⁺
Radioisotopes in rheumatology	417, 685 ⁺
Radiojodretention, regionale, Ganzkörperprofilscanner	40, 632 ⁺
Radiojod, Strahlenschutzprobleme	155, 648 ⁺
Radiokardiographie und Echokardiographie bei Herzkrankheiten	249, 661 ⁺
Radiokolloide, Abfluß aus Vorderkammer	388, 683 ⁺
Radionuclide bone uptake, blood supply	561
Radiopharmaceuticals in hospitals	517
Rare earths bone uptake	531
Recirculation, transit time curves	221, 656 ⁺
Refokussierung von Ganzkörperprofilen	15, 631 ⁺
Regional left ventricular function	227, 657 ⁺
Regionales Trapping	737
Renal blood flow, continuous radioisotope infusion studies	376, 682 ⁺
Renal plasma flow, hypertension, propranolol treatment	381
Renographie, quantitative	381
Rheumatology, use of radioisotopes	417, 685 ⁺
Scanicaamera, collimation, scintigraphie du corps entier	333, 673 ⁺
Scanning of pancreas, variations of shape	695, 723 ⁺
Scanning, total hip replacement	453, 689 ⁺
Scattered photons, Monte Carlo-simulation	788
Schilddrüsenkarzinome, hämatologische Befunde nach ¹³¹ J-Therapie	177, 650 ⁺
Schilddrüsenkarzinome, strahleninduzierte	189, 652 ⁺
Schilddrüsenuptake, 20 Minuten	397
Schlitzkollimator, Eigenschaften	31, 632 ⁺
Scintigraphie du corps entier, collimation, Scanicaamera	333, 673 ⁺
Scintigraphie hépato-splénique, colloïde de phosphate tricalcique-Sn- ^{99m} Tc	107, 641 ⁺
Scintigraphy, skeletal, in hemodialysis patients	461, 690 ⁺
Scintillation camera, dead time measurements	321, 671 ⁺
⁷⁵ Se-selenomethionine, pancreas scanning	695, 723 ⁺

Sensitivity-resolution, optimal compromise	791
Skeletal scintigraphy in hemodialysis patients	461, 690 ⁺
Skeletal uptake	57, 635 ⁺
⁸⁵ Sr microspheres, blood flow in bone	563
Stimulationsindex, autonomes Schilddrüsenadenom	739
Strahlenbelastung der Schilddrüse durch ¹³¹ J-Hippurat	580
Strahleninduzierte Karzinome	189, 652 ⁺
Strahlenrisiko bei diagnostischen Dosen	187, 652 ⁺
Strahlenschutz bei Umgang mit Radiojod	155, 648 ⁺
Strahlenschutz, Ganzkörperzähler	43, 632 ⁺
Suppressionstest, bei Schilddrüsenautonomie	399
Szintigrammbefundung, quantitative, Leber	311, 670 ⁺
Szintigraphie bei Knochentransplantation	761
Szintigraphie intraokularer Tumoren	341, 675 ⁺
Table, for patient for Gammacamera	307, 669 ⁺
^{99m} Tc-Albumin, Anastomosenfunktion	569
- albumin, continuous radioisotope infusion studies	376,
^{99m} Tc bone scanning after hip-replacement	454, 689 ⁺
- Diethyl-IDA, Leberfunktionsszintigraphie	707, 723 ⁺
- DTPA Clearance	67, 636 ⁺
- EHDP, quantitative Gelenkszintigraphie	433, 686 ⁺
- Erythrocyten, Blutvolumenänderungen	241, 660 ⁺
- H.E.D.P. whole body retention	57, 635 ⁺
- HSA, gated blood pool studies	227, 657 ⁺
- Humanalbumin, Blutvolumenänderungen	241, 660 ⁺
- Humanalbumin, Lymphdrainage des Auges	387, 683 ⁺
- MDP bone uptake and blood supply	561
- Hepatobida, Radiocholegraphie	719, 723 ⁺
- Hepatobida, Sequenzszintigraphie	703, 723 ⁺
- TLD-Messung in vivo, Strahlenbelastung	167, 649 ⁺
-, Leberdurchblutung	591
- MDP, skeletal scintigraphy, hemodialysis patients	461, 690
- Mikrokolloid, Lymphdrainage des Auges	387, 683 ⁺
- Mikrosphären, Venographie	619
-, 20 Minutenaufnahme, autonomes Schilddrüsenadenom	731

- radionuclide angiography	755
- Pertechnetat, Diagnose von Augentumoren	344, 675 ⁺
- Pertechnetat, Funktionsszintigraphie, Venographie	620
- pertechnetate, labelled erythrocytes, blood pool scanning	447, 687 ⁺
- Pertechnetat, quantitative Gelenkszintigraphie	433, 686 ⁺
- Pyrophosphat, Knochentransplantation	761
- Pyrophosphat, Knochenakkretion	38, 632 ⁺
- Schwefelkolloid, Lymphdrainage des Auges	387, 683 ⁺
- Sn-colloïde de phosphate tricalcique, marqueur hépatosplénique	107, 641 ⁺
- sulphur colloid and 67 Gallium citrate, double isotope technique in diffuse liver disease	75, 637 ⁺
- Thioglukose in der Nierendiagnostik	97, 640 ⁺
-, use in rheumatology	417, 685 ⁺
Thermoluminiszenzdosimetrie von ^{99m} Tc in vivo	167, 649 ⁺
Thorotrast, Inkorporationsmessung	5, 629 ⁺
Thrombosedagnostik, Venographie und Lungenszintigraphie	619
Thyreoidale Autonomie, Früherkennung	397
Thyroidectomy, effect on thyrotoxicosis	409, 684 ⁺
Thyroid imaging, X-ray fluorescence	287, 665 ⁺
Thyrotoxicosis, effect of thyroidectomy	409, 684 ⁺
²⁰¹ Tl myocardial perfusion imaging	227, 657 ⁺
- myocardial imaging	257, 663 ⁺
Tomoscintigraphie d'Anger	767
Toxic nodular goiter, thyroid stimulating antibodies	745
Transit time curves, influence of recirculation	221, 656 ⁺
TRH-Test bei autonomen Schilddrüsenadenomen	731
Trace elements, tumour distribution	137, 645 ⁺
Tumore, intraokulare, Kameraszintigraphie	341, 675 ⁺
Thyroid stimulating antibodies, Graves' disease, toxic goiter	745
Tumour localization with iodinated Bleomycine	129, 644 ⁺
Uric acid turnover	469, 691 ⁺
Uninmessungen, Inkorporationsüberwachung	150, 646 ⁺

Ventilationsszintigraphie mit ^{125}Xe on	553
Venographie und Lungenperfusionsszintigraphie, Thrombose- diagnostik	619
Ventrikulo-atriale Anastomosen, nuklearmedizinische Tests	569
Ventrikulo-peritoneale Anastomosen, nuklearmedizinische Funktionstests	569
White blood cells, labelling with ^{111}In -oxine	541
Whole-body counter, shadow shield	57, 635 ⁺
^{125}Xe zur Ventilationsszintigraphie, Herstellung im Reaktor	553
^{133}Xe , mesure débits sanguins cérébraux régionaux	349, 676 ⁺
^{133}Xe , regional brain blood flow	499
X-ray fluorescence techniques, thyroid imaging	287, 665 ⁺
Zirrhose, Leberdurchblutung bei	591

Bayrische
Staatsbibliothek
München